

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE
I. G. KOVAČIĆA 1, Zlatar
ODJEL EPIDEMIOLOGIJE

N/p UČENICIMA

OSOBLJU ŠKOLE

RODITELJIMA

PREDMET: UPUTE za postupanje kod zaraze svrabom

Poštovani,

Svrab ili scabies je infekcija kože grinjom *Sarcoptes scabiei*. To je maleni parazit ,često oku nevidljiv koji se ukopava ispod površine kože pacijenta te dovodi do svrbeža, crvenog osipa na mjestima koja se grebu.

.Najčešće lokalizacije svraba na tijelu su između prstiju šake, na ručnom zglobu ,podlakticama, laktovima, pazusima, donjoj strani trbuha, unutarnoj strani bedara, spolovilu ,donjoj strani stražnjice.

Inkubacija svraba je 2-6 tjedana , maksimalno 8 tjedana. Za to vrijeme osoba predstavlja izvor infekcije za okolinu.

Svrab se prenosi s oboljele na zdravu osobu: direktnim dodiranjem kože na kožu, spolnim odnosom, rubljem, odjećom, ručnicima i posteljinom. Povećani rizik postoji u kolektivima , -škole ,vrtići, vojne nastambe, mnogočlana domaćinstva zbog bliskog kontakta u zatvorenom prostoru.

Liječenje i prevencija : Svi koji su bili u kontaktu s oboljelim bez obzira jesu li razvili simptome ili ne trebaju se tretirati.

Preparati koji su na raspolaganju su emulzija benzil benzoata (terapija 5 dana) i krema s permetrinom (Scabigel terapija 1 dan).

Lijek mora prepisati liječnik pa molim sve roditelje da se jave svojim liječnicima za recept i uputu kako trošiti terapiju.

Odjeća i posteljina se mora oprati na 90oC i nakon sušenja izglacati. Ukoliko to nije moguće odjeću i posteljinu treba odložiti u plastične vreće na dva tjedna. Nakon dva tjedna oprati na temperaturi prikladnoj za materijal. Prostorije treba najprije vlažno prebrisati pa onda usisati dok su još vlažni podovi.

Sve informacije možete dobiti kod epidemiologa ;
Dr.Popijač-Cesar 099 245 5545

S poštovanjem!

Dr.med . Gordana Popijač Cesar ,spec . epidemiolog